

EUROALG S. Scheda Tecnica

Concime organico azotato fluido - Estratto fluido di lievito contenente alghe brune.

COMPOSIZIONE

Composizione: Carbonio (C) organico 10%; Azoto (N) organico 1%; pH 8;
Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa
30%

Estratto concentrato di alga *Ascophillum nodosum*
Estratti di lievito (sostanza secca: 40%)

Sono presenti, naturalmente contenuti nei materiali d'origine:

- Elementi minerali (boro, calcio, cobalto, ferro, fosforo, magnesio, manganese, molibdeno, potassio, rame, selenio, zinco etc.)
- Vitamine (ac. Ascorbico, biotina, carotene, ac. Folico, ac. Folinico, ac. Nicotinico, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12, vitamina K, tocoferolo)
- Carboidrati (mannitolo, laminarina, ac. Alginico etc.)
- Promotori naturali di crescita

CARATTERISTICHE

Concime naturale a base di estratti di lievito fermentati ed estratto concentrato di alghe *Ascophillum* della migliore qualità provenienti dai mari più puliti e incontaminati del nord Europa. Il prodotto è ricchissimo di preziosi oligominerali, di fattori vitaminici, di carboidrati e di promotori naturali di crescita.

Esplica una spiccata funzione rivitalizzatrice naturale stimolando la produttività delle colture in termini qualitativi oltre che quantitativi. Aumenta la resistenza delle piante alle fisiopatie e alle avversità.

MODALITÀ D'IMPIEGO e DOSAGGI

– **Applicazioni fogliari:**

Fruttiferi, agrumi, actinidia, vite, orticole da foglia e da frutto: 300-500 g/hl (3-5 Kg/ha)

Si può applicare in alternativa ad **AMMINOSTIM Bio** oppure in abbinamento con lo stesso (miscelando i due prodotti ai rispettivi dosaggi minimi).

– **Fertirrigazione:**

Fruttiferi, agrumi, actinidia, vite, orticole da foglia e da frutto, ornamentali: 0,7-2 Kg/1.000 m²

Si può applicare periodicamente ad integrazione degli altri biopromotori **EUROVIX**. Nelle applicazioni fogliari con prodotti rameici, si raccomanda di miscelare Euroalg s a seguito di saggi preliminari su piccole superfici per valutarne l'eventuale sensibilità varietale. Su orticole da foglia non applicare nelle 2 settimane pre-raccolta.

Seguire le avvertenze in etichetta.

